

Rappel de la bonne utilisation des EPI

Extrait SVI-INS.004 Utilisation des équipements de protection et de matériel de sécurité

Gants

Durée optimale du port des gants = **15 minutes**

1 paire de gants = 1 geste pour 1 patient

Pour les prélèvements respiratoires le port de deux paires de gants est préconisé



Masques

Type de masque	Fréquence de changement sans dépose du masque	Pour qui ?
MASQUE CHIRURGICAL 	Toutes les 4 heures	☞ Patients symptomatiques ☞ Personnel assurant l'accueil des patients
MASQUE FFP2 	Toutes les 8 heures sans le déposer	☞ Préleveurs

La Société française d'Hygiène Hospitalière (SF2H) recommande : De ne pas réutiliser un masque dès lors qu'il a été manipulé et ôté du visage.

Comment mettre mon masque chirurgical ?



Comment mettre mon masque FFP2?



Les lunettes

Les lunettes de protection (en cas de risque de projection), **la blouse** (tenue professionnelle), **la surblouse ou le tablier à usage unique** (en cas de risque de projection + précaution contact (BMR)) doivent être à disposition.

Rappel de l'habillage /déshabillage dans le cadre de prélèvement respiratoire

Certains prélèvements exposent à un risque d'éternuement ou de toux par inadvertance de la part du patient. **Durant un épisode épidémique viral** (COVID-19, grippe...), il est préférable de préconiser le port de masque FFP2, ports de gants comme pour tout prélèvement à visée bactériologique s'intéressant à la sphère ORL.

Habillage



Déshabillage

