PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE EN RÉPONDANT AU QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS - Document à caractère confidentiel -

En gras : à renseigner obligatoirement

À compléter en lettres majuscules, noter les espaces / apostrophes / tirets

PATIENT	Nom naissance Nom utilisé		ÉTIQUETTE PATIENT Sexe ☐ H ☐ F	
	1 ^{er} Prénom Prénom utilisé			Date naissance/...../.....
	L'identité du patient est vérifiée à l'aide d'un justificatif à haut niveau de confiance (RNIV 2021) : ☐ carte nationale d'identité, ☐ passeport, ☐ titre permanent de séjour, ☐ livret de famille*, * fournir la pièce d'identité des parents pour les mineurs ☐ extrait d'acte de naissance*			
	Prise en charge : N° Sécurité Sociale Mutuelle N° télétransmission/AMC : <small>(matricule INS) code INSEE lieu naissance</small>			
Tél. portable Mail : @ <small>(n° responsable légal si mineur)</small>				
Adresse : CP : Ville :				

PRÉLÈVEMENT	Préleveur (Nom/Prénom/Qualité) :		
	Date : / /	Heure : h	
	Mode de recueil : ☐ Milieu Amies ☐ Enat ☐ Urines 1 ^{er} jet ☐ Autre :		
	Localisation/Origine : ☐ Urétral ☐ Ulcérations / Vésicules génitales (sur gland/sillon/verge) ☐ Ano-rectal		
Remarque : pour les prélèvements de lésions autres que les ulcérations/vésicules au niveau génital (sillon balano-préputial, gland ou verge), se reporter à RI-ENR.090 « Renseignements et préconisations : Prélèvements cutanés »			
Le prélèvement est à acheminer selon les recommandations décrites au verso, avec cette fiche complétée			

DONNÉES CLINIQUES	SYMPTÔMES ☐ Non ☐ Oui, lesquels :	CONTEXTE CLINIQUE
	☐ Présence d'un écoulement urétral	☐ Suspicion IST* (contact à risque, partenaires multiples...)
	☐ Sensation de brûlure ou gêne en urinant	☐ Partenaire IST* positive
	☐ Douleurs testiculaires ou scrotales	☐ Récurrence / Persistance IST* et/ou contrôle après recherche négative de CT/NG/TV/MG (recherche <i>U. urealyticum</i>)
☐ Douleurs abdominales	☐ Contrôle après traitement	
☐ Fièvre (depuis le : / /	☐ Autre :	
☐ Envie d'uriner plus fréquentes / Incontinence	* Infection sexuellement transmissible	
☐ Sang dans les urines		
☐ Présence de vésicules et/ou de lésions ulcérées		
☐ Autre :		
Ces informations seront prises en compte pour l'interprétation et la validation biologique des résultats (Norme NF EN ISO 15189)		

TRAITEMENT	Traitement en cours ou récent Antibiotique : ☐ Oui ☐ Non ☐ À venir Antifongique : ☐ Oui ☐ Non ☐ À venir
	Date de début / / ou Date d'arrêt du traitement / /
	Nom du traitement :

LABO	Réception / / à h Par	☐ Non conforme : <small>(réputé conforme si non coché)</small>
	Échantillon : ☐ Milieu Amies (Eswab orange) ☐ Enat ☐ Multicollect	
	☐ Autre :	

Avant le prélèvement

- ❶ Préférable avant toute antibiothérapie.
- ❷ Éviter toute toilette intime et tout traitement local la veille au soir et le matin du prélèvement.
- ❸ Réaliser le prélèvement de préférence le matin avant d'uriner ou au moins **1 heures** après la dernière miction.

	EXAMEN	LOCALISATION	MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT
PRÉLÈVEMENT URÉTRAL (PU)	Cyto-bactério-mycologie urétrale (bactéries dont <i>Neisseria gonorrhoeae</i> par culture, levures/ Candida)	- Si l'écoulement est présent au <u>niveau du méat urétral</u> : Le recueillir avec un écouvillon fin et le transférer sur eSwab, sinon faire sourdre une goutte de pus par pression du gland. - Si l'écoulement est absent : Réaliser un raclage endo-urétral avec un écouvillon fin en l'introduisant sur 1 cm dans l'urètre et en tournant doucement, puis le transférer sur milieu de transport d'Amies. Dans ce cas-là, asymptomatique, il est préférable d'effectuer la recherche de Gonocoque par PCR sur l'urine du 1er jet.	<p>Milieu Amies (eSwab orange)</p> <p>Manipulation du tube et de l'écouvillon :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrir le sachet Effectuer le prélèvement avec l'écouvillon Ouvrir avec précaution le tube et insérer l'écouvillon Casser la tige de l'écouvillon en laissant l'écouvillon dans le tube Bien revisser le bouchon Ecrire les informations d'identification sur le tube
	Recherche par PCR de <i>Chlamydia trachomatis</i> (CT), <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (NG), <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> <u>Recherche systématiquement associée au PU</u>	1 ^{er} jet d'urine après le prélèvement urétral Cf : RI-ENR.004	<p>Multicollect</p> <p><i>Si absence d'urines de 1er jet, la recherche de CT/NG peut se faire sur le Prélèvement Urétral (amies).</i></p>
AUTRES DEMANDES	Autres mycoplasmes urogénitaux dont <i>Ureaplasma urealyticum</i> (seconde intention)	1 ^{er} jet d'urine après le prélèvement urétral Cf : RI-ENR.004	<p>BD neutre</p>
	Recherche d'Herpès (HSV)	Vésicules, lésions ulcérées	
	Recherche de <i>Treponema pallidum</i> (syphilis) et d' <i>Haemophilus ducreyi</i> (agent du chancre mou)	Lésions ulcérées	<p>eNAT</p>

Toutes ces recherches peuvent être effectuées au niveau ano-rectal.

Après le prélèvement

- ❶ **Identifier l'échantillon : Nom de naissance, 1^{er} Prénom, Date de naissance et Sexe**
- ❷ Mettre les échantillons dans un sachet de transport accompagnés de la prescription
- ❸ **Transmettre le sachet le plus rapidement au laboratoire.**
 - Délai **recommandé** : 24 heures à température ambiante
 - Délai **maximum acceptable** : 48 heures à température ambiante

Remarque : Seules les recommandations du manuel de prélèvement en ligne font foi : (<https://labosudb.manuelprelevement.fr/>)